

Ala posterior 5 venulis intermediis; sectore radii prope basim tractu cum procubito fuso.

Long. corp. ♂ 8 mm.

— al. ant. 11'3 »

— — post. 10'5 »

Patria. Francia: «Laifour (Ardennes), P. Lesne, 1925». Museo de París.

El aspecto del ala anterior es de *Nothochrysa* Mac Lachl. o de *Nathanica* Nav., pero la separan otros caracteres, por ejemplo la cortedad y delgadez de las antenas y del cuerpo, el labro truncado y no escotado.

La forma de la celdilla discal de la *Nothochrysa*, que no parece anomalía en este ejemplar, sino carácter fijo y propio, no me ha parecido suficiente para formar un nuevo género, y sí para denominar la especie *nothochrysoides*.

Por lo demás en el color tan oscuro difiere notablemente de todas las especies que se conocen de Europa.

EFÉMERA NUEVA DE ETIOPIA

Cænis æthiopica sp. nov.—Caput fulvo-flavum, margine anteriore labri et superiore frontis fuscis; linea longitudinali ad genas nigra; oculis nigris; vertice tumido, flavo-fulvo; antennis articulo primo cylindrico, flavido, seta subfusca; palpis apice articularum fusco.

Thorax flavo-fulvus, mesonoto antice tumido, postice in angulum producto.

Abdomen flavo-fulvum, urodiis albis, medio duplo longiore lateralibus.

Pedes albidi.

Alæ basi latæ, apice parabolico, membrana hyalina, reticulatione alba, costa, subcosta et radio nigris, subcosta crassa; perpaucis venulis, una in area radiali prope medium, ceteris aliarum arearum prope basim.

Long. corp. 2'5 mm.
— al. 3 »

Patria. «Ethiopie mérid. Nanoropuo, bords du Rodolphe; 565 m., Mission de l'Omo, C. Arambourg, P. A. Chapuis et R. Jeannel, 1932-1933». Museo de París. 43 ejemplares, sin duda atraídos por la luz.

LONGINOS NAVÁS, S. J.

Trasladamos de la Revista de *Caza y Pesca*, de Madrid, el siguiente artículo publicado en el número de Noviembre:

Rafidióptero (Ins.) nuevo de España

por el

P. Longinos NAVÁS

La ocasión del VI Congreso Internacional de Entomología, entre otras impresiones agradables, me proporcionó la visita al Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias y su Sección de Biología de las Aguas continentales, que dirige D. Luis Vélaz de Medrano. En el Museo de ésta, mucho más rico de lo que yo podía esperar, llaméme la atención un Rafidióptero que a primera vista no conocí, rotulado por su propio colector D. Ramón Otero, Preparador de la mencionada Sección, a quien pedí permiso, gustosamente concedido, para llevármelo a Zaragoza y estudiarlo. No pude diferir su estudio, y por creerlo nuevo, paréceme oportuno que su descripción se publique en el BOLETÍN DE PESCA Y CAZA, dirigido por D. Luis Pardo García, quien se anticipó a ofrecermé sus páginas para mis trabajos.

Rhaphidia Oteroi sp. nov.

Similis *alienæ* Nav.

Caput (figura *a*) triangulare, longius latitudine, pone

Bibliography of the Neuropterida

Bibliography of the Neuropterida Reference number (r#):
974

Reference Citation:

Navás, L. 1935 [1936.??]. Efémora nueva de Etiopía. Boletín de la Sociedad Entomologica de España 18:70-71.

Copyrights:

Any/all applicable copyrights reside with, and are reserved by, the publisher(s), the author(s) and/or other entities as allowed by law. No copyrights belong to the Bibliography of the Neuropterida. Work made available through the Bibliography of the Neuropterida with permission(s) obtained, or with copyrights believed to be expired.

Notes:

File:

File produced for the Bibliography of the Neuropterida (BotN) component of the Global Lacewing Digital Library (GLDL) Project, 2006.