


② 05165 Entomology

L 482

I 3 P4

John D. Oswald



New York
State College of Agriculture
At Cornell University
Ithaca, N. Y.

Library

Poda, N. 1761. "ordo Neuroptera" in

05165

PP. 11-12, 45-46.

Copies from W. Junk, 1915, Facsimile Edition in Cornell Ent. Lib.

**INSECTA
MUSEI GRÆCENSIS,**

**QUE
IN ORDINES, GENERA ET SPECIES**

**JUXTA
SYSTEMA NATURÆ
CAROLI LINNÆI**

**DIGESSIT
NICOLAUS PODA,
E SOCIETATE JESU,
PHILOSOPHIAE DOCTOR, ET
MATHESEOS PROFESSOR.**

**PROSTANT
APUD JOANNEM BAPTISTAM
DIETRICH, BIBLIOPOLAM.**

**GRÆCII,
TYPIS HEREDUM WIDMANSTADII.
ANNO M. DCC. LXI.**

1761

DATE DUE

RETURN TO

ENTOMOLOGY LIBRARY
Cornell University
Ithaca, N. Y.

PAT. MM. 21, 1908
Syracuse, N. Y.
Makers
Savold Bros., Inc.
Binder
Pamphlet
Pressboard

482
P4

Facsimile-Edition. Ed. W. Junk. No. 19

N. PODA
INSECTA MUSEI GRÆCENSIS

GRÆCII 1761



W. JUNK
BERLIN W, Sachsische Str. 58
1915

IO ORDINUM AC GENERUM

CIMEX. *Rostrum inflexum. Antennae thorace longiores. Ala IV. cruciato complicatae : superioribus antice coriaceis. Dorsum planum thorace marginato. Pedes cursorii.*

APHIS. *Rostrum inflexum. Antennae thorace longiores. Ala IV. erectæ, aut nullæ. Pedes ambulatorii. Abdomen postice saepius bicornis.*

CHERMES. *Rostrum pectorale. Antennae thorace longiores. Ala IV. deflexæ. Thorax gibbus. Pedes saltatorii.*

COCCUS. *Rostrum pectorale. Abdomen postice setosum. Alæ II, erectæ macrosculis. Feminæ apteræ.*

THRIPS. *Rostrum obscurum. Antennæ longitudine thoracis. Corpus lineare. Abdomen sursum reflexile. Ala IV. rectæ dorso incumbentes, longitudinales, angustæ.*

ORDO III. LEPIDOPTERA.

Alæ IV. imbricatae squamis, Os lingua involuta spirali. Corpus pilosum.

PAPILIO. *Antennæ apicem versus crassiores, saepius clavato capitatae. Ala (sedentis) erectæ, sursumque convenientes (volatu diurno).*

SPHINX.

CHARACTERES. II

SPHINX. *Antennæ medio crassiores s. ultra que extremitate attenuatæ, subprismaticæ. Ala deflexæ (volatu graviore vespertino s. matutino).*

PHALENA. *Antennæ setaceaæ a basi ad apicem sensim attenuatae. Ala (sedentis) saepius depressæ (volatu nocturno).*

ORDO IV. NEUROPTERA.

Alæ IV, nudaæ, venis reticulatae. Cauda saepius aliquo Sexus adminiculo instructa, inermis.

LIBELLULA. *Os maxillosum : maxillis pluribus. Antennæ thorace breviores. Ala extensa. Cauda particulis hamofo foliaceis.*

EPHEMERA. *Os edentulum absque palpis. Ala erectæ : posticis minimis. Cauda saepius setosa.*

PHRYGANEA. *Os edentulum : palpis IV. Antennæ thorace longiores. Ala incumbentes & inferioribus platicatis.*

HEMEROBIUS. *Os dentibus duobus. Ala deflexæ, nec plicatae. Antennæ thorace convexo longiores.*

PA-

12 ORDINUM AC GENERUM

PANORPA. *Rostrum corneum, cylindri-
cum: palpis... Antennæ thorace lon-
giores. Cauda maris chelata.*

RAPHIDIA. *Os dentibus duobus in Ca-
pite depresso corneo. Alæ deflexæ.
Antennæ longitudine thoracis antici
elongati cylindrici. Cauda feminæ
feta recurva laxa.*

ORDO V. HYMENOPTERA.

*Alæ IV. membranaceæ, plerisque. Acu-
leus caudæ, sed nullus in maribus.*

CYNIPS. *Os maxillis absque proboscide.
Aculeus spiralis, fæpius reconditus.*

TENTHREDO. *Os maxillis absque pro-
boscide. Alæ planæ tumidæ. Acu-
leus laminis duabus Serratis vix pro-
minentibus.*

ICHNEUMON. *Os maxillis absque pro-
boscide. Aculeus exsertus vagina cy-
lindrica bivalvi. Abdomen fæpius pe-
tiolatum. Alæ lanceolatæ planæ,
in omni sexu.*

SPHEX. *Os maxillis absque proboscide.
Alæ plano incumbentes (nec plica-
tæ), in omni sexu. Aculeus puncto-
rius reconditus.*

VE.

CHARACTRES. 13

VESPA. *Os maxillis absque proboscide.
Alæ superiores plicatæ, in omni se-
xu. Aculeus punctorius reconditus.*

APIS. *Os maxillis sique proboscide infle-
xa vaginis duabus bivalvibus. Alæ
planæ, in omni sexu. Aculeus Feminis
& Neutris punctorius reconditus.*

FORMICA. *Squamula eretta thoraci ab-
dominique interjecta. Aculeus Fe-
minis & Neutris reconditus. Alæ Ma-
ribus & Feminis; sed Neutris nullæ.*

MUTILLA. *Alæ nullæ in omni sexu. Cor-
pus pubescens. Thorax postice retu-
sus. Aculeus reconditus punctorius.*

ORDO VI. DIPTERA.

*Alæ duæ. Halteres clavati, solitarii,
pone singulam alam, sub squamula
propria.*

OESTRUS. *Os absque proboscide aut
rostro exerto.*

TIPULA. *Os capitis elongati labiis late-
ralibus instructum palpisque duo-
bus incurvis teatum, absque pro-
boscide & rostro.*

MUSCA. *Os proboscide carnoſa. Labiis
duobus lateralibus: palpi nulli.*

TA-

94 ORDO III LEPIDOPTERA.

(e) Pyrales. *Alis conviventibus in figuram deltaeideam forcicatani.*

Fatinalis. 34. P. *Pyralis recurvicornis* alis politis anticis fuscescentibus : stri-
gis repandis albis area interjecta
glaucia, posticis albis punctis ma-
ginalibus nigris.

Habitat in Farina.

(f) *Tineæ.* *Alis convolutis fere in cylindrum, fronte prominula.*

* **Metallica.** 35. P. *Tinea thorace alisque anticis auratis, posticis obscure æneis, antennis longissimis.*

*Antennæ corpore triplo longiores, extro-
sum aliae versus basim obscure æneæ.*

† **Granella.** 36. P. *Tinea alis albo nigro-
que reticulatis, capite flavo cri-
stato.*

Pellionella. 37. P. *Tinea alis canis medio
puncto nigro, capite subgriseo.*
S. N. L.

*Larva latitat intra sacculum confectum
e vestimentis, quæ destruit.*

(g) **Alucitæ.** *Alis digitatis fissis ad basim.*
Pentadactyla. 38. P. *Alucita alis patentibus
fissis quinquepartitis niveis : di-
gito quinto distincto. S. N. L.*

OR.

*** (1) *** 95

ORDO IV.

NEUROPTERA. Mit neßförmigen
Flügeln.

LIBELLULA. Libellen. Wasser-
Nymphen.

Alis patentibus aquiescentes.

4 **Maculata.** 1. L. alis posticis ad basim ni-
gricantibus omnibusque ad mar-
ginem exteriorem maculis dua-
bus cibnoloribus.

Flaveola. 2. L. alis basi luteis, posticis ad
basim, omnibusque ad marginem
exteriorem macula nigricante ;
thorace abdomeque luteo ni-
gro maculato.

Rubicunda. 3. L. oculis, thorace, abdo-
mineque coccineo, alis omnibus
macula marginali rubra. posticis
ad basim luteis.

*Abdomen basim intx & apicem atte-
nuctum.*

Rœf. inf. 2. squat. 2. t. 8. f. 4.

Depressa. 4. L. alis omnibus basi nigrican-
tibus macula marginali nigra
thorace lineis duabus flavis, ab-
dome latiore flavo, subdiapha-
no, depresso lanceolato.

β. D.

ORDO IV.

B. D. abdomine opaco supra cæru-
lescente, lateribus flavescente.
Cæterum præcedenti simillima.

Ræf. inf. 2. aquat. 2. pag. 33. die
platte, und breit leibige Wasser
Nymphæ.

Aenea. 5. L. thorace, abdomineque vi-
ridi aeneo, alis basi luteis, ma-
culâ marginali nigra.

Grandis *B.* 6. L. alis hyalinis macula mar-
ginali nigra, thoracis lineis qua-
tuor flavis, abdomine viridi, cæ-
ruleoque vario.

Maxima, corpus tres, ale expansæ quo-
tuer digitos agunt.

Ald. inf. 2. t. 1. f. 6. speciosa ac ele-
gans Perla.

Ræf. inf. 2. aquat. 2. t. 2. f. 1. pag. 1.
Wasser-Locke, Wasser-Jungfer,
Augen-Schiesser. Norimberg. vulg.
Teufels-Völk, Teufels-Vferd. vic-
lici vulg. Glaser, Perl-Flüge.

• • Oculi distantes, remotique.

Virgo. 7. L. alis erectis coloratis.
a. L. corpore sericeo nitido, alis lu-
teo fuscis : margine immaculatis.
S. N. L.

y. L.

NEUROPTERA.

y. V. corpore viridi cæruleo, alis
subfuscis : puncto marginali al-
bo. *S. N. L.*

• t. V. alis sature cæruleis, apice pal-
lidioribus, corpore eleganter vi-
ridi.

Ræf. inf. 2. aquat. 2. t. 9. f. 5.

• t. V. alis ad apicem & basim hyalinis,
in medio cæruleis.

Ræf. inf. 2. aquat. 2. t. 9. f. 7.

Puella. 8. L. alis erectis hyalinis.

a. P. corpore sericeo, alis puncto
marginali fusco. *S. N. L.*

y. P. corpore sericeo, alis puncto
marginali nigro. *S. N. L.*

t. P. corpore cæruleo, cinereoque
alterno, alis puncto marginali
nigro. *S. N. L.*

EPHEMERA. Ufer-Wj.

* *Cauda trifeta.*

* *Ignita.* 1. L. cauda trifeta, oculis rubris,
alis ad apicem albis, abdomine
fuscō, pedibus anticus longissimis.
Corpus tres lineas longum.

• • *Cauda bifeta.*

* *Maculata.* 2. E. cauda bifeta, alis reti-
culatis albis nebuloso maculatis
C cor

corpo fuscō, annulis lucidioribus.

Culiciformis. 3. E. cauda bifeta corporis longitudine, alis apicem versus albīs, corpore fuscō.

Habitat in aquosis.

* Speciosa. 4. E. cauda bifeta corpore triplo fere longiore pedibus anticis longissimis cyaneis, alis albīs, corpore fuscō.

Habitat in aquosis.

PHRY-

Ephemeræ ovalē comitunt aquis, atque bīne matres cum morte iuantes, vel exanimes in superficie hognum frequenter reperuntur. Inde nata larva antennis longis ab domine vertebrose uringue pinnis 7. aliiformibus. Et fibrosis infra singulas auleo recessio cauda trifurca longissima pilis lateribus ornata, pinnas continentē agitat, earumque motu plācide procedit in aqua, incervato tamen corpore saltus majores sepe facit. Elapsis s. circiter mensibus gibbi duo majores castanei coloris in capite cernuntur, & sacci duo thoraci accrescent nascitur. Ephemera alas soventes; ubi metamorphosi proxima aqua superficiem petit, limbū vasis accedit, ac vixit in modum se se torquendo ac fricando pelliculam perruptam excuit, proditque E. speciosa feciis pedibus aquae aliquamdiu infidens, unde tandem se librabat in auras.

PHRYGANEA.

Bicaudata. 1. P. alis venoso reticulatis, thorace medio sulco longitudinali, cauda bifeta.

Corpus digitum æquat; cauda interdum corpus subæquat.

Æ. B. fronte puncto, thorace medio linea longitudinali flava.

Statu proecedentis, sed triplo fere minor.

Nebulosa. 2. P. nigra, alis incumbentibus cinereo nebulosis, caudæ setis truncatis.

* Grammatica. 3. P. alis hyalinis flavescens fronte V. vel C. nigro inscripta, cauda bifeta.

Larva intra tubulum conicum arundinaceum lotet, quem nūquam egreditur. Quando in altum se promovere cupit, caput, atque sex pedes quibus remigat, protendit, antici brevissimi, posticī vero longissimi sunt. Caput flavum. Thorax cinereus. Reperi complures ejusmodi larvas ad arundines stagni mense Maij e quibus omnibus P. Grammaticas obtinui.

HEMEROBIUS. Land - Libelle
Nacht - Nymphe.

Perla. 1. H. viridis alis hyalinis, vasis viridibus. S. N. L.
Chrysops. 2. H. viridi nigroque varius, alis hyalinis reticulatis oculis auratis.
Aureus oculorum nitor paulo post vitam perit.

Formica leo B. 3. H. glaber alis hyalinis maculis nigris, & una marginali alba apicem versus; antennis clavatis.

*Ref. inf. 2. aquat. 2. t. 20. pag. 126
Die grösste Land - Libelle. oder
Nacht - Nymphe.*

Larva intra arenam latitat formicis plurimum visitans, atque hinc appellatur Ameistrander, Ameis-Löwe.

PANORPA.

Communis. 1. P. alis æqualibus nigro maculatis. S. N. L.

Ald. inf. 3. t. 5. f. 9. culex cauda scorponis.

Mas. Cauda scorponis in modum sursum incurvata articulo ultimo crassiore, & duobus spiculis armato. Fe-

mi-

NEUROPTERA. TOI

mina abdomine attenuato, parte posteriore bifida, retrorsili.

RAPHIDIA.

Opniosis. 1. R. capite depresso, ore maxilloso, alis hyalinis macula marginali fusca.

Mas abdomine mutico. Femina cauda setosa seta recurva corpore breviori.

* Styriaca. 2. R. pedibus anticis capiti adnexis, autennis filiformibus thorace valde elongato brevioribus, alis hyalinis macula marginali fulva.

Ad sepes borti tres repertæ.

Oculi magni troniñuli virides murati.

Os palpis 4. Pedes antici femoribus longis gracilibus, tibiis decoloribus latis crassis dentatis denticulo ultimo longiore & unco majore instruuntur.

Aegre ac tarde progreditur, nempe unco, & tibiis complicatis solis femorum geniculis infixtens, quibus explicatis ad ascendendum utitur. Abdomen oblongum oratum fulvum albo maculatum.