第5卷第3號 昆

蟲

昭和6年9月

東京昆蟲學會

Vol. V, No. 3

KONTYÛ

Sept. 1931

Tôkyô Entomological Society

上高地並にその附近の蜉蝣・襀翅・毛翅類昆蟲

上野益三(大津)

M. Uéno: Mayflies Stoneflies and Caddisflies collected in Kamikôchi and its surrounding districts, Prov. of Shinano.

昭和5年7月下旬 並に同年10月中旬の2 同筆者は上高地並にその 附近山地を跋涉して昆蟲を採集した。以下に記す所はその際成蟲を得た蜉蝣類・積翅類・毛翅類である。種類は必ずしも豐富だとは言へぬが、同地方昆蟲相の一部の資料にはなるであらう。採集した範圍は中ノ湯より上流の上高地溪谷の大部分、即ち上高地盆地の他に白澤德澤等の谷・一俣槍澤等・それから島々谷南澤・烏川一の澤・中房川等である。採集した昆蟲の中毛翅類は札幌の桑山覺氏に御願ひして査定して頂いた。弦に厚く御禮を申上ける。

I. 蜉蝣目 EPHEMEROPTERA

1. Ephemeridae

Ephemera japonica McLachlan, 1875 (スカシバカゲロウ)
1 亞成蟲、島々谷歸留上方(海拔約 1270m.). 25. VII. 1930。

[昆蟲 第5卷第3號 昭和6年(1931)]

Baëtidae

2. Baëtis thermicus Ufino, 1931(アカハラカゲロウー上野) 7 dd・19、中ノ湯、15-16. X. 1930。

赫褐色の體と無色透明な翅とを持つた小形の蜉蝣で、中ノ場の梓川に面した一湧出部(温度 58° C)の下流約 36° C のプールの周邊部に羽化してるた。詳しい記載は拙著 10 を参照願ひたい。これに近い種類は歐洲産の $Ba\ddot{e}tis$ gemellus E_{ATON} である。

3. Baëtis shinanonis Uéno, 1931, loc. cit. (シナノカゲロウー上野) 3 d d・1 f、中房川・信濃坂附近(海拔約 1100 m.). 17. X. 1930。 體長 5-6mm の小形の蜉蝣で、幼蟲(若蟲) は山地溪流の流の急激な所に居 る。その若蟲が上高地竝にその附近の溪流に極めて废く分布してゐることか 6考へて、本種の山地に於ける分布の廣いことが想察出來る。

3. Ecdyonuridae

- 4. 屬種未詳亞成蟲 1, 中房川、17. X. 1930。
- 5. Iron nipponicus Ufino, 1931, loc. cit. (ヒラタカゲロウ―上野)。 1 み、中房川信濃坂附近、18. X. 1930。

II. 積 翅 目 PLECOPTERA

1. Perlidae

- 6. Perla (Oyamia) gibba KLAPALEK, 1907 (オホヤマカハゲラ) 1 年、島々谷南澤鰡留下流、25. VII. 1930。
- 7. Periodes yarizawana Uéno 1931, loc. cit.(シナノアミメカハゲラー上野) 1 %、槍澤・赤澤岩小屋附近、21. VII. 1930。
- 8. *Alloperla* sp. (ミドリカハゲラの1種) 破損したので種の同定が出來ない。
- 9. Alloperla sapporensis (OKAMOTO, 1912)(エグミドリカハゲラ) 1 ♀、上高地小梨平、15. X. 1930。

岡本博士の記事²⁾によれば札幌·信濃八ヶ嶽等で得られてゐる。

¹⁾ UENO,M. 1931-Einige neue Ephemeropteren und Plecopteren aus Mittel-Japan. Annot. Zool. Jap., 13, 2.

²⁾ OKAMOTO, H. 1912-Erster Beitrag zur Kenntnis der Japanischen Plecopteren. Trans.-Sapporo Nat. Hist. Soc.. Vol. 4, Part 2.

10. Isoperla nipponica Okamoro, (1912)(フタスデミドリカハゲラモドキ) 1 ♀、上高地小梨平、15. X. 1930。

この種は既に岡本博士(loc. cit)により上高地から記録せられてゐる。その他の地方では信濃追分・日光等で採集せられた記錄がある。

11. Peltoperla naka Uéno, (1931, l.c.)(ヤマヒロムネカハゲラ―上野, 1 キ、中ノ湯附近の梓川、19. X. 1930.

2. Nemuridae

- 12. Nemura (Nemura) gladinta Uéno, 1929 (カマラクロオナシカハゲラ—上野)
 - 1 年、鳥川一ノ澤、20. VII. 1930; 1 年、上高地小梨平、15. X. 1930; 1 年、上高地田代池、16. X. 1930; 1 年、中房川信濃坂附近、17. X. 1930。
- この種は京都北方貴船で採集の標本により記載せられたり。該地では5月中旬に羽化する。上記産地の羽化時期と比較すると低地(海拔 400m前後)と、高地(前記諸地は大體 1,000m 以上である)との間に羽化の時期に可成の遅速があることがわかる。且夏に出るものと秋に出るものと兩方あることもわかる。
- 13. Nemura (Protonemura) nohirae Окамото, 1922.
 - 1 年、上高地小梨平、15. X. 1930; 1 年、上高地田代池、16. X. 1930;
 - 1 平、中房川信濃坂附近、17. X. 1930。

此の種は既に岡本博士により³⁾ 上高地から記録せられてゐる。その他の產地として同博士の記事に見えるのは信濃白馬嶽·紀伊岩湧山·大和吉野等で最後が模式標本の產地である。

- 14. Nemura (Protonemura) hotakana Uéno, 1931, l. c. (オホクロオナシカハゲラー上野)
 - 1 3・1年、上高地小梨平、15 X. 1930; 1 年、中房川信濃坂附近、18.X.1930。 大形の Nemura で雌雄の外部生殖器に特徴がある。

3. Capniidae.

15. Capnia bituberculata Uéno, 1929(クロカハゲラー上野)

¹) UÉNO, M. 1929-Studies on the Stoneflies of Japan. Mém. Coll. Sci., Kyôto Imp. Univ., Ser. B, Vol. IV, No. 2, p. 134.

²⁾ OKAMOTO, H. 1922-Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Japanischen Plecopteren. 朝鮮 總督府勸業模範場歐文報告, Vol. 1, No. 1, 水原, 1922.

108

1 J、上高地小條平、15. X. 1930。

この種の模式標本は但馬國椿色で採集せられたもので、該地では2月上旬 積雪上に羽化する。信濃安曇平でも2月下旬に羽化する。筆者は昭和5年2 月末穂高町附近を流れてゐる穂高川河原の積雪上で多數の雌雄を排へた

16. Capnia nivalis Uéno, (1929)(セッケイムシ、雪溪蟲)

2 早早、槍澤雪溪下端、22. VII. 1930。

従來廣く知られてゐる種類で日本アルプスに顾く分布してゐる。松村松年博士により命名せられた Apteroperla yazawae MATSUMURA なるもの雪溪蟲の學名として用ゐられてゐることがあるが、こは Capnia nivalis の異名と認むべく、且その記載は未發表である(本誌、Vol. V. No I, 拙稿參照)。

III. 毛 翃 目 TRICHOPTERA

1. Arctopsychidae

- 17. Arctopsyche maculata ULMER, 1907(シロフツヤトピケラ)
 - 1 ²、常念嶽(鳥川ーノ澤上流)、20. VII. 1930; ^{1 ²}、徳本峠(上高地側白澤上流)、25. VII. 1930。

2. Phryganeidae.

- 18. Oligostomis fluvipes (MATSUMURA, 1904)(アミメトビケラ)
 - 1 J、上高地田代池、24. VII. 1930。
- 19. Holostomis melaleuca McLachlan, 1871 (ゴマフトビケラ)
 - 3 우우、上高地田代池、24. VII. 1930。

大形のトピケラで從來上高地からよく知られてゐる。日本動物圖鑑(P.708)にNeuron:a melaleuca McLachilan の名で圖解せられてゐるのはこの種で、今桑山氏の教示に從つて上記學名を用ゐた。

附、アルプス東麓の積翅類

昭和5年の春から夏へかけて松本平で清澤晴親氏(長野縣豐科町)が得られた禮翅類で、種類は僅か6種だがこの地方の禮翅類相資料の一として弦に附記する。

- 1. Perlodes yarizawana UENO, 1931(前出)
 - 1 P、南安墨郡小氣村、VII. 1930。

Ş.

- 2. Perla (Kamimuria) tibialis PICIET, 1841(カハゲラ) 1 平、南安墾郡豐科町、VIII. 1930。
- 3. Neoperla nipponensis (McLachlan, 1875)(ヤムトフタツメカハゲラ) 1 年、南安燮郡今井村、VIII. 1930.
- 4. Alloperla thoracica (OKAMOTO, 1912)(クロムネミドリカハゲラ) 1 年、南安曼郡豐科町、15. VIII. 1930。
- 5. Alloperla nikkoënsis (Окамото, 1912)(ニツコウミドリカハゲラ) 1 早、南安曇郡小倉村、VII. 1930。
- 6. Nemura sp.
 - 1 年、豐科町、24. V. 1930。

(昭和6年5月20日)